Conduite des génisses allaitantes

L'élevage de la génisse est déterminant pour sa carrière future et influence à la fois précocité et longévité.

1 De la naissance au sevrage : une croissance soutenue

■ Le colostrum doit être consommé le plus tôt possible après la naissance (2 litres entre 2 et 6 heures) et pendant les 5 à 6 jours qui suivent, pour installer une première immunité. Le colostrum en surplus peut être congelé pour l'utiliser en cas de besoin. Attention, pour en préserver les qualités, une décongélation en douceur au bain marie est la meilleure des solutions.

■ La croissance du veau est conditionnée par la production laitière de sa mère.
Attention aux vêlages de fin d'hiver et aux primipares qui terminent leur croissance et ont une capacité d'ingestion plus réduite ! Un état corporel insuffisant au vêlage et une sous-alimentation trop prolongée réduisent la quantité de lait produite en début de lactation.

■ Jusqu'au sevrage, la jeune génisse au pâturage augmente sa consommation d'herbe régulièrement.
En été et en automne, il est souvent nécessaire de distribuer une complémentation à base de concentrés, afin de compenser les baisses de quantité et de qualité de l'herbe.

■ Le poids au sevrage doit atteindre 40-45 % du poids adulte, soit 230 à 300 kg selon la race et l'âge au vêlage.

URCO

UNCEIA

Pour faciliter la conduite en lots, il est souhaitable de regrouper le plus possible les naissances. Il faut maintenir un mois moyen de naissance précoce pour obtenir des femelles suffisamment développées à 26-27 mois.

Objectifs de croissance des génisses selon le poids adulte

	Poids adulte (kg)		
Objectif de poids (kg)	550	650	750
• au sevrage à 8 mois	230	260	290
• en fin de 1er hiver	290	335	380
• à la mise à la reproduction	395	475	545
• à l'entrée dans le 3e hiver	490	585	670
• après le 1er vêlage	470	560	650

d'après Institut de l'élevage « Fiche action élevage allaitant : Conduite des génisses d'élevage »

UNCEIA
le réseau de la génétique animale

©UNCEIA 2010

2 Du sevrage à l'insémination

- La puberté est plus liée au poids qu'à l'âge. Elle apparaît quand l'animal atteint 55 à 60 % de son poids adulte.
- Il faut mettre les génisses à la reproduction une fois qu'elles ont atteint 65 à 70 % de leur poids adulte (soit environ 400 à 550 kg selon la race et l'âge au vêlage).
- Les génisses réalisent au pâturage 60 à 80 % de leur croissance corporelle.
- Le pâturage d'automne doit être arrêté suffisamment tôt afin d'éviter des croîts trop faibles avant la mise à la reproduction et une mobilisation prématurée des réserves corporelles chez les gestantes.
- Des conditions insuffisantes d'alimentation et de logement pendant l'hiver peuvent entraîner un anœstrus chez des génisses régulièrement cyclées à l'automne.
- Pour un vêlage à 2 ans, il est très important d'adapter les courbes de croissance. L'objectif de poids après vêlage reste le même que pour un vêlage à 3 ans. La croissance journalière doit donc être plus soutenue.

Courbes de croissance pour des vêlages à 2 et 3 ans
Exemple d'une conduite en charolais en système traditionnel

d'après ITEB
« Troupeau allaitant mode d'emploi, Raisonner pour mieux conduire » 1991



URCO

URCO

La fertilité des génisses est bonne, mais…
Éviter de les synchroniser ou de les inséminer au moment de la mise à l'herbe.
Eviter l'excès d'engraissement : viser une note de 2,5 à l'insémination et de 3,5 au vêlage.
Inséminer avec un taureau ayant un bon index « Facilité de Naissance ».